


SEMILLAS **FITO**

Envase hermético.
Máximo Vigor y Germinación.

Hermetic packing.
Maximum Vigour and Germination.



Marco de siembra
DISTANCIA
a = 1 cm
b = 1 cm
PROFUNDIDAD:
de 0,5 a 1 cm

Marco de plantación
a = 40 cm
b = 30 cm

■ **ESCAROLA RIZADA DOBLE DE VERANO-ESTIVAL.** Variedad que forma una mata grande, de hojas color verde claro y anchas, tanto limbo como peciolo, de bordes rizados y corazón liso. De gran resistencia a la subida. **Siembra.** En semillero a la dosis de 1 gr/m² enterrando la semilla 0,5 cm. **Aclareo.** Con las plantas de 3 cm de altura para lograr plantas bien enraizadas. **Trasplante.** Al marco de 40 cm x 30 cm. **Recolección.** Atar las plantas 15 días antes para blanquearlas.

■ **CURLED ENDIVE DOUBLE SUMMER-ESTIVAL.** Variety forms a large bush with wide leaves which are green both in the outer portions as well as the stem. Leaves have a ruffled edge and form a full heart. High resistance to bolting. **Sow** in nursery at a rate of 1 gram per square meter, burying at a depth of 0,5 cm. **Thin** when plants reach 3 cm height to obtain good root structure. **Transplant** to 40 cm rows, leaving 30 cm between plants within the same row. **Harvest:** Tie plants shut 15 days previous to harvest to whiten plant.

■ **CHICOREE FRISÉE DOUBLE D'ETE-ESTIVAL.** Variété à forte végétation, avec des feuilles d'un vert clair, larges, au bord frisé et au coeur plein. Très résistance à la montée à graine. **Semer** en pépinière ou en place, de mars à juin, à la dose de 1 gr au m², et à une profondeur de 0,5 cm. **Eclaircir** lorsque la plante atteint 3 cm de haut, pour obtenir des plantes bien enracinées. **Repiquer** à intervalles de 40 x 30 cm. Lier les plantes 15 jours avant la récolte pour obtenir un parfait blanchiment.


■ **INDIVA RICCIA DOPPIA D'ESTATE-ESTIVAL.** Varietà a forte vegetazione con foglie di color verde chiaro ed ampie con bordi ricci ed a cuore pieno. Grande resistenza alla montata a seme. **Semina.** In vivaio impiegando 1 gr/m² interrando il seme a 0,5 cm. **Diradamento.** Con la piante a 3 cm di altezza per ottenere piante ben radicate. **Trapiantare** alla distanza di 40 cm x 30 cm. **Raccolta.** Legare le piante 15 giorni prima per l'imbianchimento.

■ **CHICÓRIA FRIZADA DUPLA DE VERÃO ESTIVAL.** Variedade de forte vegetação, com folhas verde claras, largas, de bordos frizados e coração cheio. De grande resistência ao espigamento. **Sementeira:** Em viveiro ou no local definitivo, de Março a Junho, na dose de 1 gr. de semente por M² e a uma profundidade de 0,5 cm. **Desbaste:** Quando as plantas tiverem 3 cm de altura, para provocar um bom enraizamento. **Transplantação:** A distância de 40 cm x 30 cm. **Colheita:** Atar as plantas 15 dias antes para branquearem.


■ **ANTIADI RIZADA DOBLE DE VERANO - ESTIVAL**
Πικνία που σχηματίζει πολύ πυκνό φύλλωμα ανοικτού πράσινου χρώματος και φορδιά φύλλα με σγουρά άκρα και γεμάτη καρδιά. Σπορά: σε φυτώριο σε αναλογία 1 γραμ./τμ. και σε βάθος 0,5 εκ. Μεταφύτευση: σε σειρές ανά 30 εκ. και σε απόσταση 40 εκ. μεταξύ των φυτών. Συγκομιδή: δέστε τα φυτά 15 ημέρες πριν την συγκομιδή τους για να ασπρίσουν.

■ **إنديقيا (نوع من الخس) من بروكسل.** نوع من الخس غليظة قصيرة بيضوية متناسقة الشكل عاتة الزرع: في المرحلة الأولى للحصول على جنود، وبعدها تزرع بعمق ٠٥ سم لكي تنمو الأوراق المطبوعة ذات اللون الأبيض التسميد: بنسبة ٢-٢-٢. الحصاد: عند الحصول على ثمره أوراقها متلاصقة وطرية

CLIMA MEDITERRANEO



CLIMA CONTINENTAL



● Siembra - Semis
Sowing time

--- Crecimiento hasta trasplante
Growth until transplantation

× Transplante - Repiquage
Transplantation

— Crecimiento hasta maduración
Growth until Ripening

■ Recolección - Récolte
Harvesting

□ Conservación
Storage

⌒ Protección con túnel de plástico
Plastic tunnel protection

Normas y reglas CEE - Categoría Standard
CEE rules and standards
SEMILLAS FITO, S.A. Barcelona (España)



Lot	Date dernière analyse	Controlée jusqu'en	Contenu
Lote	Fecha último análisis	Control hasta	Contenido

322578-01 01-08 2013 8

GRS NETU