

NOMBRE:	CRIMSON SEEDLESS	
Origen:	California. Cruce de Emperador x C33-199.	
Sinonímias:		
Fenología: Las fechas indicadas resultan de observaciones realizadas en campos de referencia, pudiendo variar según la zona de cultivo.	Estación:	Media-Tardía.
	Fecha Brotación:	2ª decena de marzo.
	Fecha Floración:	
	Fecha Envero:	
	Fecha Maduración:	2ª decena de agosto.
	Fecha caída hoja:	
Racimo:	Grande, cónico y compacto.	
Baya:	Color:	Roja.
	Forma:	Cilíndrico elipsoidal.
	Tamaño:	Medio.
	Sabor:	Neutro.
	Pulpa:	Crujiente.
	Piel:	Gruesa.
	Semillas:	Apirena (sin semilla).
Fertilidad:	Alta.	
Producción:	Alta.	
Vigor:	Muy alto.	
Conducción:	Parral y espaldera.	
Portainjertos:	Poco vigorosos o 161-49.	
Poda:	Media, 8 yemas.	
Técnicas:	Mejora con el aclareo de racimos, respondiendo bien al uso de ácido giberélico. El uso de Etheption en el envero mejora el color.	
Aptitud:	Muy buena resistencia en planta, a la manipulación, al transporte y a la conservación frigorífica.	
Observaciones:	El problema primario asociado con su producción es el color insuficiente de la baya. También el pequeño tamaño de la baya es un problema. Desgraciadamente, las prácticas culturales que aumentan su producción y el tamaño de la baya llevan a la reducción de su color. Es una variedad muy sensible al odio. Es una variedad muy bien recibida en el mercado.	