

TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE ROEDORES

ATENCIÓN

ESTE *PORTACEBO* CONTIENE UN RATICIDA ANTICOAGULANTE

Riesgos de envenenamiento por anticoagulantes

ENVENENAMIENTO PRIMARIO por ingestión accidental, tanto de seres humanos como de otros animales (especialmente vertebrados de pequeño tamaño, aves, reptiles y peces; extremar las precauciones con los animales domésticos). Afecta a la coagulación sanguínea siendo su principal síntoma la diátesis hemorrágica (hemorragias espontáneas), derivada del efecto antiprotrombina que puede hacerse evidente en un plazo mínimo de 24 horas y máximo de 72 horas.

ENVENENAMIENTO SECUNDARIO: existe riesgo de intoxicación secundaria para la fauna que se alimenta de roedores que han ingerido estos anticoagulantes.

Primeros auxilios:

En caso de contacto con el producto lavar inmediatamente la piel y/o los ojos con agua abundante.

En caso de ingestión NO provoque el vómito. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y muestre la etiqueta/envase/ficha de seguridad.

Antídoto: Vitamina K1.

CALENDARIO DE INSPECCIONES

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PUNTO DE CONTROL N°

Producto	Registro N°

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, Tel. 91 562 04 20.