

NOMBRE:	RED GLOBE	
Origen:	California. Cruce múltiple (Hunisia x Emperor) x (Hunisia x Emperor x Nocera).	
Sinonímias:	Globo rojo.	
Fenología: Las fechas indicadas resultan de observaciones realizadas en campos de referencia, pudiendo variar según la zona de cultivo.	Estación:	Media.
	Fecha Brotación:	18 de marzo.
	Fecha Floración:	6 de mayo.
	Fecha Envero:	12 de julio.
	Fecha Maduración:	18 de septiembre.
	Fecha caída hoja:	24 de noviembre.
Racimo:	Muy grande, cilíndrico cónico, alado, con alas de longitud media a larga y de semisuelto a semicompacto.	
Baya:	Color:	Roja, roja vino, rosa, roja violácea.
	Forma:	Esférica.
	Tamaño:	Muy grande.
	Sabor:	Neutro.
	Pulpa:	Crujiente.
	Piel:	Gruesa, resistente y fácil de desprender.
	Semillas:	Existentes.
Fertilidad:	Muy alta. Mejor fertilidad en la 5ª y 6ª yema.	
Producción:	Muy alta.	
Vigor:	Alto.	
Conducción:	Se adapta a conducciones en parral y espaldera.	
Portainjertos:	Va bien con 161-49, 110-R, no tanto con 1103-P, no obstante se aconseja injertar en portainjerto vigoroso para mantener buen equilibrio entre vegetación y producción.	
Poda:	Poda media. 5 yemas.	
Técnicas:	Efectuar un desbrote muy leve. Para evitar quemaduras de los racimos expuestos al sol, se aconseja efectuar una buena distribución de los brotes y despuntarlos luego para provocar el desarrollo de las yemas de nieto y lograr un buen techo de hojas. Un exceso de racimos puede provocar falta de coloración.	
Aptitud:	Presenta una buena conservación en planta, muy buena conservación frigorífica y es resistente al transporte.	
Observaciones:	Debido a las altas temperaturas y a la insolación directa, se puede producir el asolanado de los racimos, sobre todo en plantaciones jóvenes, por la falta de follaje . Se produce en menor medida en plantaciones adultas si los racimos están bien cubiertos por los pámpanos.	