



Envase hermético.
Máximo Vigor y Germinación.

Hermetic packing.
Maximum Vigour and Germination.



Distancia	Profundidad
a	0
a	2
a	4
a	6
a	8
b	10

Marco de siembra
DISTANCIA

a= 30 cm

b= chorillo

PROFUNDIDAD:


de 1 a 2 cm




Marco de plantación
a= 150 cm

b= 40 cm

CLIMA MEDITERRANEO



CLIMA CONTINENTAL



● Siembra - Semis
Sowing time

— Crecimiento hasta trasplante
Growth until transplantation

X Transplante - Repique
Transplantation

— Crecimiento hasta maduración
Growth until Ripening

— Recolección - Récolte
Harvesting

— Conservación
Storage

mm Protección con túnel de plástico
Plastic tunnel protection

Normas y reglas CEE - Categoría Standard
CEE rules and standards

SEMISSAS FITÓ, S.A. Barcelona (España)

■ ESPARRAGO MARY WASHINGTON. Variedad que produce turiones de color verde medio-oscuro en cultivo sin aporcar. Lisos, cilíndricos y con las puntas muy prietas incluso con altas temperaturas. **Siembra:** En cultivo sin aporcar, Febrero-marzo, en semillero, para trasplantar los rizomas al cabo de 1 año puestos en camallones o surcos separados 1,5 m., y entre si 40-45 cms. El cultivo puede llegar a durar más de 10 años, empezando a producir dos años después del trasplante.

■ ASPARAGUS MARY WASHINGTON. Variety that produces a dark green edible portion which is smooth, cylindrical and has very dense points even in zones with high temperatures. **Sow:** In February-March, in nursery. **Transplant** the rhizomes after one year to 1,5 m rows, separating plants 40-45 cm within the same row. Cultivation of the same plant can last more than 10 years, beginning production two years after transplant.

■ ASPERGE MARY WASHINGTON. Variété produisant des turions de couleur vert moyen foncé, lisses, cylindriques, dont les pointes restent serrées même par temps très chaud. **Semer** en février-mars, en pépinière, pour **repiquer** les griffes au bout d'un an, en billes, à une distance de 40-50 cm et séparer à 1 m 50. La **culture** peut durer plus de 10 ans et commence à produire 2 ans après le repiquage.

■ ASPARAGO MARY WASHINGTON. Varietà che produce turioni di color medio verde scuro, lisci, cilindrici con punte molto chiuse anche con le alte temperature. **Semina:** Febbraio-Marzo in vivaio per trapiantare le "zampe" alla fine di 1 anno in assolature separate a 1,50 m e separate a distanza di 40-45 cm. La coltivazione può arrivare a durare più di 10 anni, incominciando a produrre 2 anni dopo il trapianto.

■ ESPARGO MARY WASHINGTON. Variedade que produz turionés de cor verde médio-escuro. Lisos, cilíndricos e com as pontas muito firmes mesmo com altas temperaturas. **Sementeira:** Fevereiro-Março em viveiro para transplantar os rizomas após 1 ano em camalhões separados de 1,5 m. Plantar nos camalhões afastadas de 40-45 cms. O cultivo pode chegar a durar mais de 10 anos, começando a produzir 2 anos após a transplantação.

■ ESPAÑA "MARY WASHINGTON"

Ποικιλία με ελαφρώς καταρρά φύλλα που σχηματίζουν μία μεγάλου μεγέθους κεντρική. Στο εσωτερικό της κεφαλής σχηματίζεται κορδάλλια με φύλλα άσπρου χρώματος. Ποικιλία κατάλληλη για φθινοπωρινή συγκομιδή.

هليون أبيض من ثافارا. نوع من الهليون يعطي ثماراً كبيرة رأسها أبيض ملائص نوعية جيدة جداً. طرقه يصل إلى اللون الذهبي نوع كبير للإنتاج الزراعي: في شتاء وفي أشهر شباط وآذار التقلي = ١٢-١٤ يوماً. يتم عملية نقل البراعم ووضعها في أتمام تبعد ٥٠ سم وبين البراعم والآخر مسافة ٤٠ - ٥٠ سم. المحصول: يمكن أن يستمر لمدة ١٠ سنوات وينتج بعدها بعضاً بالغطا الشر عادم بعد الرزع

Lot	Date dernière analyse	Contrôleé jusqu'en	Contenu
Lote	Fecha último análisis	Control hasta	Contenido

330508-01 10-07 2012 8 GRS NETO



8410579 901219